



Doseringsanbefaling ved D-vitaminmangel¹

25-OH vitamin D	Divisun daglig	Oppstart
< 25 nmol/L	100µg (4000 IE) x 1	3 måneder
25-50 nmol/L	50µg (2000 IE) x 1	3 måneder

25-OH vitamin D	Vedlikehold - etter oppnådd målverdi	
50-125 nmol/L	Minimum 20µg (800 IE)	Daglig dosering

Divisun doseres en gang daglig. Indikasjon: Forebygging og behandling av D-vitaminmangel hos voksne og ungdom. Tablettene kan tas med eller uten mat, og kan svelges hele eller knuses ved behov. Pasienters individuelle behov avgjør hvilken styrke som velges. Dagsdosen bør ikke overskride 100µg.

Målområdet for 25-OH vitamin D: 50-125 nmol/L. Kontroll av 25-OH vitamin D etter 3 mnd.¹

Overvektige pasienter, pasienter med malabsorpsjon og de som står på bestemte legemidler kan ha behov for større doser vitamin D (x 2-3).¹



VIATRIS

UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON:

- Kontraindisert ved sykdommer og/eller tilstander som fører til hyperkalsemi eller hyperkalsiuri.
- Kontraindisert ved nefrolitiasis, nefrokalsinose og hypervitaminose
- Nedsatt nyrefunksjon: Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon kan andre former for vitamin D være nødvendig. Brukes med forsiktighet ved nedsatt nyrefunksjon. Effekt på kalsium- og fosfatnivået bør kontrolleres.
- Bør forskrives med forsiktighet ved sarkoidose og fosfatnivået bør kontrolleres mht kalsiuminnhold i serum og urin.
- Ved langtidsbehandling bør kalsiumnivåene i serum kontrolleres og nyrefunksjonen kontrolleres ved målinger i serumkreatinin. Spesielt viktig hos eldre som bruker hjerteglykosider eller diuretika, og de med stor tendens til calculusdannelse.
- Divisun inneholder isomalt, sukrose og natrium.

Divisun (kolekalsiferol, D₃): refusjon og pris

Individuell refusjon for Divisun med blåreseptøknad, i følge § 5.14, blåreseptforskriften, sendes via tjenesteportalen for helseaktører for pasienter som har en av diagnosene under.

Pasienter med kliniske symptomer, eller en D-vitaminmangel påvist ved blodprøve;²

- Alvorlig D-vitaminmangel, plasma 25-OH vitamin under 25 nmol/L
- D-vitaminmangel ved ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom
- Cøliaki
- Primær hyperparatyroidisme
- D-vitaminmangel etter mage/tarm operasjon: ved denne indikasjonen er Detremin dråper og Vigantol dråper forhåndsgodkjent på blå resept, og skal prøves først

I tillegg kan det søkes om individuell refusjon til pasienter med følgende diagnoser:

- Cystisk fibrose
- Kronisk leverlidelse
- Kronisk nyresykdom
- Forebygge D-vitaminmangel etter fedmekirurgi.

Få oversikt over aktuelle diagnosekoder og vilkår i fulltekst på helsedirektoratets nettsider ved å skanne QR-koden.



Reseptgruppe C: Divisun koster, kr 306,80 for 50 µg, 423,50 for 100 µg og kr 127,- for 20 µg for 90 tabletter for alle styrker. Oppbevaring: Maks 30°C, i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet.



Ytterligere informasjon preparatomtalen, SPC:

- Divisun 2000IE og 4000IE SPC 30.06.2023
- Divisun 800IE SPC 30.06.2023

Referanser

1. Nasjonal veileder i Endokrinologi, Elektrolytter og ernæring, Vitamin d-mangel, <https://metodebok.no/emne/cjW3S7aJ/vitamin-d-mangel/nasjonal-veileder-i-endokrinologi>, lest 21.10.2025
2. Helsedirektoratet, rundskriv, stønad ved helsetjenester, vedlegg 1 til § 5-14 legemiddellisten, <https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/kapittel-5-stonad-ved-helsetjenester/vedlegg-1-til-5-14-legemiddellisten/virkestoffer/kolekalsiferol-vitamin-d3>, lest 21.10.2025

Viatri AS | Hagaløkkveien 26, PB 194, 1371 Asker, Norway
infororge@viatri.com – www.D-vitaminmangel.no



VIATRIS